

Cum să vă protejați de infecțiile tractului urinar



Evitați deshidratarea!

Beți suficiente lichide.



Nu vă abțineți mult timp și repetați în a urina!

Duceți-vă, pe cât posibil, direct la toaletă și goliiți-vă vezica urinară complet, de îndată ce simțiți nevoia de a urina! Stați relaxate în timpul urinării și nu vă încordați.



Purtați haine călduroase!

Protejați-vă de hipotermie prin purtarea unor haine adecvate.



Măsuri de igienă pentru protecția dumneavoastră

- Folosiți săpun cu pH neutru atunci când spălați zonele intime pentru a proteja flora vaginală a corpului
- Nu folosiți jet de apă în zona intimă pentru a nu favoriza pătrunderea germenilor în uretră
- Ștergeți-vă întotdeauna din față spre spate, după scaun, nu invers
- Nu folosiți prezervative, diafragme sau supozitoare vaginale acoperite cu substanțe necunoscute, iritante
- Urinați cât mai curând posibil după actul sexual



Utipro plus pentru gestionarea simptomelor
și prevenirea inflamației ulterioare

Utipro® plus Atu-ul tău

Utipro® plus în infecții acute și recurente ale tractului urinar

- Conține ingrediente naturale
- Acționează simultan în 2 zone – la nivel intestinal și la nivelul vezicii urinare
- Are un mod de acțiune unic, inovativ
- Îmbunătățește rapid simptomele infecției de tract urinar
- Poate fi administrat cu sau fără antibiotice
- Este bine tolerat

Când ar trebui să vă adresați medicului?

- Dacă simptomele se înrăutățesc
- Dacă nu există nici o îmbunătățire a simptomelor
- Dacă există durere în zona rinichilor
- Dacă urinați cu sânge
- Dacă starea generală este alterată
- Dacă aveți febră
- Dacă suferiți de alte boli sau există și alți factori de risc
- Dacă sunteți gravidă sau alăptați



Utipro® plus

ÎN INFECȚIILE TRACTULUI URINAR

Nou!
ÎN FARMACII



Utipro® plus Atu-ul

ÎN INFECȚIILE TRACTULUI URINAR




Film protector + Hibiscus + Propolis



Infecția tractului urinar o problemă arzătoare


- ➔ Infecția tractului urinar este o boală infecțioasă caracterizată prin disconfort și senzație de arsură la urinare, o nevoie urgentă de a merge și a urina, urinare obișnuită a unor cantități reduse de urină
- ➔ Cu cât sunt tratate mai repede primele simptome, cu atât sunt mai mari șansele ca inflamația iminentă să fie înăbușită în faza de dezvoltare.



- ➔ Cea mai frecventă cauză a infecției tractului urinar e reprezentată de **bacteriile (de ex. E.Coli)** prezente la nivelul **intestinului**. Acestea se pot răspândi de la nivel intestinal, ajungând prin uretră în **vezica urinară** unde determină inflamația dureroasă a mucoasei.
- ➔ Femeile sunt mai predispuse la infecție decât bărbații din cauza uretrei mai scurte

Utipro® plus Film protector + Hibiscus + Propolis

Utipro® plus
acționează simultan în 2 zone



Utipro® plus acum disponibil în România

Utipro® plus
pentru adulți și copii de peste 14 ani

... în caz de infecții acute ale tractului urinar

- ➔ La apariția primelor simptome
- ➔ 1 capsulă de două ori pe zi timp de 5 zile consecutiv, cu sau fără antibiotice



... pentru a preveni recidivele

- ➔ O capsulă pe zi timp de 15 zile consecutive pe lună
- ➔ Mai multe cicluri de administrare

Utipro® plus

Utilizare: Utipro este destinat controlului și prevenirii infecțiilor tractului urinar produse de agenți patogeni, precum E. coli și alte bacterii gram (-) implicate în mod normal în etiologia infecțiilor tractului urinar. Produsul, pe bază de gelatină și xiloglucan (hemiceluloză), acționează mecanic în lumenul intestinal, evitând contactul agenților patogeni cu mucoasa intestinală. Acest contact este primul pas în proliferarea acestora și trecerea ulterioară în tractul urinar. Produsul se administrează pe cale orală, de la apariția primelor simptome de tulburări ale tractului urinar, cu scopul de a reduce proliferarea agenților patogeni care poate degenera în infecții. În caz de recidive ale infecțiilor, compusul este destinat și prevenirii unor noi episoade, în care proliferarea agenților patogeni a cauzat repetarea infectării tractului urinar. Prezentare: Compusul este prezentat sub formă de capsule, ambalate într-un blister. Compoziție: Combinație de gelatină și xiloglucan (hemiceluloză), propolis, Hibiscus sabdariffa, dioxid de siliciu, stearat de magneziu, amidon de porumb. Doze: Compusul trebuie administrat pe cale orală: la apariția primelor simptome de disconfort urinar - 2 capsule per zi timp de 5 zile. Pentru prevenirea recidivelor 1 capsulă per zi timp de cel puțin 15 zile consecutive per lună (dacă este necesar, produsul poate fi administrat în cicluri repetate). Instrucțiuni de utilizare: A se înghiți capsula cu apă. Avertismente: * Diagnosticarea unei infecții a tractului urinar trebuie făcută de către un profesionist din cadrul sistemului de asistență medicală. Vă recomandăm, prin urmare, să consultați personalul medical în caz de îndoieli cu privire la diagnostic, în caz de simptome severe, cum ar fi febră mare, în cazul în care vârsta dumneavoastră este sub 14 ani sau dacă aveți alte boli sau prezentați factori de risc. * O infecție acută a tractului urinar poate necesita un tratament farmacologic cu un antibiotic. Compusul nu este un antibiotic, neavând nici efect bactericid, nici efect bacteriostatic împotriva agenților patogeni și, prin urmare, acesta nu va substitui un tratament recomandat de către un profesionist din cadrul sistemului de asistență medicală. În cazul în care este necesar un tratament antibiotic, compusul poate fi administrat concomitent cu acesta. * Chiar dacă nu se cunosc efecte secundare, nu trebuie să utilizați acest produs în primele luni de sarcină sau în timpul alăptării. În astfel de cazuri, consultați-vă mai întâi medicul. Contraindicații și efecte secundare: Compusul nu trebuie utilizat în cazul pacienților cu hipersensibilitate cunoscută la gelatină sau la oricare dintre celelalte componente ale compusului. Produsul este un dispozitiv medical marca CE disponibil în farmacii.

