

Prospect

Utipro[®] plus^{AF}

Scopul utilizării

Utipro[®] plus AF este destinat controlului și prevenirii infecțiilor tractului urinar produse de agenți patogeni, precum E. Coli și alte bacterii gram (-), implicați în mod normal în etiologia infecțiilor urologice.

Utipro[®] plus AF este o formulă avansată pe bază de Xiloglucan (hemiceluloză) și Geloză (origine vegetală) care acționează mecanic în lumenul intestinal, evitând contactul agenților patogeni cu mucoasa intestinală, contact care este primul pas în proliferarea acestora și trecerea ulterioară în tractul urinar.

Utipro[®] plus AF se administrează pe cale orală, de la apariția primelor simptome de tulburări ale tractului urinar, cu scopul de a reduce proliferarea agenților patogeni care poate degenera în infecții. În caz de recidive ale infecțiilor, Utipro[®] plus AF este destinat și prevenirii unor noi episoade, în care proliferarea agenților patogeni a cauzat repetarea infectării tractului urinar.

Prezentare

Ambalaj ce conține un blister cu 15 capsule pentru utilizare de către adulți.

Compoziție

Xiloglucan, Geloză (origine vegetală), Propolis, Hibiscus sabdariffa, Dioxid de siliciu, Stearat de Magneziu (origine vegetală) și Amidon de porumb.

Instrucțiuni de utilizare

A se înghiți capsula cu ajutorul unui lichid.

Dozaj

În cazul pacienților care manifestă primele simptome de disconfort urinar, Utipro[®] plus AF trebuie administrat pe cale orală: 2 capsule per zi (1 capsulă la fiecare 12 ore) timp de 5 zile.

Pentru prevenirea recidivei, se administrează 1 capsulă per zi timp de cel puțin 15 zile consecutive per lună. Dacă este necesar, tratamentul poate fi repetat.

Acest dispozitiv medical este destinat utilizării de către pacienții adulți.

Avertismente

- Diagnosticarea unei infecții a tractului urinar (ITU) trebuie făcută de către un medic.
- O infecție acută a tractului urinar poate necesita un tratament cu antibiotice. Produsul nu are proprietăți bactericide sau bacteriostatice și, prin urmare, acesta nu va substitui un tratament cu antibiotic. Totuși, Utipro[®] plus AF poate fi administrat concomitent.
- Chiar dacă nu se cunosc efecte secundare, se recomandă să nu utilizați acest produs în timpul sarcinii sau în timpul alăptării, cu excepția cazului în care este indicat de către un profesionist din domeniul sănătății.
- A nu se utiliza produsul după data de expirare înscrisă pe ambalaj.
- A nu se utiliza produsul în cazul în care blister-ul este deschis sau deteriorat.
- A nu se depozita la temperaturi mai mari de 25°C. A nu se congela.
- A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor.

Contraindicații

Utipro[®] plus AF nu trebuie utilizat în cazul pacienților cu hipersensibilitate cunoscută la Xiloglucan sau la oricare dintre celelalte ingrediente.

Utipro[®] plus AF conține ingrediente de origine naturală și este:



Fără gluten



Fără lactoză



Adecvat persoanelor vegetariene



Conținut redus de zahăr



NOVENTURE, S.L
Avenida Diagonal, 549, 5^a planta
08029 Barcelona - Spain

Distribuitor:

Pharm.Fabrik Montavit Ges.m.b.H, 6067 Absam/Tirol, Austria
reprezentat de Pharm. Fabrik. Montavit Reprezentanța pentru
România, str.Poet Andrei Mureșanu, nr.5, Sect.1, apt.1, București.
Tel/Fax. +4021.230.33.51, office@montavit.ro

CE
0476

Rev.04. 15.12.2020

106789-1
2284855-01 0000